

Alerta Temprana Regional de Roya del Cafeto para el Estado de Hidalgo Ciclo Productivo 2018-2019

Versión: **abril, 2018.**

Equipo de trabajo:
DGSV-CNRF-LANREF

Categoría Epidémica de Riesgo Epidemiológico y Periodos de Manejo Preventivo

En el **Cuadro 1** se indica la categoría de riesgo acorde a la etapa de desarrollo del cultivo, así como al periodo sugerido para el manejo preventivo de Roya del Cafeto por municipio, el cual se encuentra ordenado por priorización de Categorías de Riesgo (de mayor a menor priorización).

Cuadro 1. Periodos de manejo preventivo para el ciclo productivo 2018-2019 en el estado de Hidalgo. Los municipios con categoría 4 y 3 son de accionabilidad prioritaria para el control preventivo.

Municipio	Categoría Epidémica Regional de Riesgo		Ventana Fenológica de Manejo Preventivo	Periodo de manejo preventivo focos
	2017	2018e		
Tlanchinol	3	4	Amarre-Lechoso	Abr-Jul
Calnali	2	4	Amarre-Lechoso	May-Jul
Yahualica	2	4	Amarre-Lechoso	Abr-Jul
Huautla	2	4	Amarre-Lechoso	May-Jul
Huehuetla	2	4	Lechoso	May-Jul
Huazalingo	2	4	Amarre-Lechoso	Abr-Jul
San Bartolo Tutotepec	1	4	Lechoso	May-Jul
Pisaflores	-	4	Amarre-Lechoso	Abr-Jul
Atlapexco	-	4	Amarre-Lechoso	May-Jul
Tenango de Doria	2	3	Lechoso	May-Jul

En el **Cuadro 2** se indica la estimación de hectáreas (focos regionales) por categoría de riesgo para el 2018, las cuales pueden emplearse como indicador de las hectáreas sugeridas para realizar acciones de manejo preventivo en las Áreas Regionales de Control (ARCO) durante los periodos fenológicos determinados en el **Cuadro 1**.

La superficie definida para ARCO puede ser atendida en áreas continuas (1 ARCO) o bien puede subdividirse para aplicación como ARCO independientes, de acuerdo a la logística y operatividad. Como referencia, de acuerdo a una delimitación regional de focos, un *foco temprano* sin acciones de manejo alcanza el rango de 10-500ha (Informe Epidemiológico, agosto 2015). Adicionalmente, las aplicaciones aparentemente tienen un mejor efecto en ARCOs con superficies menores de 550ha (Informe Técnico Epidemiológico. DGSV-LANREF. Diciembre, 2016).

La superficie y categorías de riesgo indicadas en la Alerta Temprana Regional están sujetas a cambios por *Severidad* de la plaga enviados a través las Alertas Semanales (e-mail).

Cuadro 2. Estimación de focos regionales de riesgo para el manejo preventivo en Hidalgo: ciclo 2018-2019.

Municipio	Categoría de riesgo regional ciclo 2018-2019	Hectáreas estimadas para manejo preventivo	Hectáreas totales (SIAP, 2017)	% de Ha Manejo preventivo (Focos)
Tlanchinol	4	3716	3716	100.0%
Pisaflores	4	1483.89	1938	76.5%
Atlapexco	4	443	443	100.0%
Calnali	4	1104	1104	100.0%
San Bartolo Tutotepec	4	380.27	2263	16.8%
Huautla	4	533	533	100.0%
Yahualica	4	395.37	470	84.1%
Huazalingo	4	499.1	670	74.4%
Huehuetla	4	475.47	4416	10.7%
Tenango de Doria	3	162.43	639	25.4%
TOTAL		9,192.53	16,192	56.7%

NOTA: El nivel de accionabilidad para el control de focos de infestación de la Roya del Cafeto se sugiere en los niveles 3 y 4. Para realizar acciones preventivas con productos químicos de forma eficiente o que tenga algún impacto regional, deberá considerarse criterios como etapa crítica, edad de la plantación, variabilidad de la severidad en planta y hoja, manejo agronómico como regulación de sombra, podas y recepas en planta, manejo de tejido mediante podas, fertilización, control de malezas, etc.

Figura 2. Categorización de Focos Regionales de Riesgo Epidémico estimado para el ciclo 2018-2019.

